

Daniel Abramowitz MD FRCSC
Colorectal and General Surgery



1333 Sheppard Ave E, Suite 243
North York, Ontario, M2J 1V1
Telephone: 647-945-2687
Fax: 416-226-1515
dabramowitz@northyorkcolorectal.ca

www.northyorkcolorectal.ca
www.nygh.on.ca/colorectalcare

患者姓名: _____ 检查日期: _____ 医院登记时间: _____

在检查时麻醉师会提供镇静剂，您在检查完毕，不可以自己驾车回家，您必须安排家人或朋友陪同，出租车司机不可作为陪同人员。

结肠镜检查准备事项（请仔细阅读）COLONOSCOPY

您需要去要药房买（不需要医生处方）

- 1 **Peglyte**（清肠药）
- 3 粒 **Dulcolax(Bisacodyl)**

请您务必遵循以下指示，而不是在PEGLYTE药瓶上的指示。

如您服用抗凝血药物，例如：Coumadin, 请在检查前4天不要服用。如您服用Plavix,请在结肠镜前5天不要服用。若您有任何问题请在您检查的前1周打电话给DR. HAMEED诊所询问。我们建议不要食用任何有小种子的食物（例如：西红柿，草莓等）。

结肠镜的前一天: _____

请不要食用任何固体食物

请从清早起床后，不要食用任何固体食物。整天只可以喝清流食饮品（清流食包括：水，不带颗粒的苹果汁，白葡萄汁，雪碧（Spirte）,姜水（Gingerale）,没有加奶的茶或咖

啡，清鸡汤，清牛肉汤，能量饮品）。**禁止食用红色或紫色饮品。**请确保整天饮足够的清流食。

早上11点 (11 A.M) :

- 请用清水服用3粒Bisacodyl
- 在同时，请按照指示说明混合PEGLYTE SOLUTION。将水装满到指示填充线（FILL LINE），摇动并彻底混合。也可以将混合好的PEGLYTE SOLUTION 放入冰箱冷却，先不要服用。

下午5点 (5 P.M)

- 请服用2升的PEGLYTE SOLUTION（半壶），建议每隔10-15分钟饮一杯直到饮完2个LITERS，也建议您可以多饮用3-4杯清流食

晚上8点 (8P.M) :

- 请服用2升的PEGLYTE SOLUTION（半壶），建议每隔10-15分钟饮一杯直到饮完2个LITERS，也建议您可以多饮用3-4杯清流食，您可以饮清流食直到午夜凌晨（12A.M)

在检查当天 :

请不要食用任何固体食物。大多数药物（处方药）可以如常用一口清水服用。**请在检查后饮足够的水**

登记：办理手续部门(ADMITTING DEPARTMENT, NORTH YORK GENERAL HOSPITAL, 4001 Leslie St., Toronto, 1st floor. Then proceed to the 1st floor, Day Surgery & Endoscopy Suites) .

在: _____

您需要准备总共在医院时间大约 3-4-小时。**您必须安排有家人或朋友驾车陪同您回家。**在检查时麻醉师会提供镇静剂，您在检查完毕后，不可以自己驾车回家。您可以在检查后的第二天驾车。

请注意：如果您错过检查将会被收取\$200 的费用。如果取消预约，必须提前3个工作日通知。