

**Dr. Peter Stotland**

**Dr. Usmaan Hameed**

电话 : 647-258-9960 传真 : 647-258-9965

**胃镜检查准备事项**

## **GASTROSCOPY INSTRUCTIONS**

**患者姓名(Patient Name):** \_\_\_\_\_ **检查日期 (Procedure Date):** \_\_\_\_\_  
**检查时间(Procedure Time) :** \_\_\_\_\_

**登记处 :** 办理登记手续部门(ADMITTING DEPARTMENT, NORTH YORK GENERAL HOSPITAL, 4001 Leslie St., Toronto, 1st floor. Then proceed to the 1<sup>st</sup> floor, Day Surgery & Endoscopy Suites.

**登记时间 (Arrival time to the hospital):**

\_\_\_\_\_

- 您需要准备总共在医院时间大约 2-4-小时
- 检查通常需要 10-20 分钟。
- 在检查时麻醉师会提供镇静剂，您在检查完毕，不可以自己驾车回家，您必须安排家人或朋友陪同。如若没有人陪同，您的检查将会被取消。出租车司机不可作为陪同人员。

### **什么是胃镜检查？**

胃镜检查是使用末端有摄影机的长管来检查消化道，食道，胃和十二指肠。

### **肠镜检查准备：**

- 在检查前午夜 12 点后请不要食用任何固体食物

- 但您可以在检查 4 小时前喝清流食饮品（清流食包括：水，不带颗粒的苹果汁，白葡萄汁，姜水（Gingerale），没有加奶的茶或咖啡，清鸡汤，清牛肉汤，能量饮品）
- 禁止食用红色或紫色饮品

### **如果您患有糖尿病**

- 您需要在检查的前一天和当天经常检测您的血糖指标
- 如果您的血糖监测指标低于 4，请立即饮用含糖饮料
- 如果您正在服用口服血糖药物（Metformin, Glyburide 等），您可以在检查当天的早上服用，然后您要在恢复食用固体食物后，按您正常时间服用药物
- 如果您用胰岛素在检查前晚服用正常剂量的一半，在检查当天早上避免服用

### **如您服用抗凝血药物**

- 请打电话到 Dr. Hameed 诊所咨询服用药物指示
- 如服用药物 Coumadin (Warfarin), 请在检查前 5 天不要服用。
- 如服用药物 Plavix (clopidogrel) 或 Ticagrelor, 请在检查前 5 天不要服用。
- 如服用新口服抗凝血药物 (NOACs) 例如: Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran: 请在检查前 2-3 天不要服用
- 如果服用阿司匹林(Baby Aspirin) :可以继续服用

**如有任何和检查有关问题请致电到 Dr. Hameed 诊所，电话:647-258-9960**